

**Załącznik nr 10
do Podręcznika
Pobierania Próbek
Pierwotnych**

Wydanie 2.0

Instrukcja samodzielnego pobierania PLWOCINY dla pacjenta
do badania mikrobiologicznego i przygotowania do wymazu gardła



Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

32 396 46 37 • 32 396 46 60
zdl@szpital4.bytom.pl

Przygotowanie pacjenta do badania:

- ✓ badanie należy wykonać przed rozpoczęciem antybiotykoterapii,



- ✓ w razie konieczności przeprowadzenia badania w trakcie antybiotykoterapii, materiał należy pobrać przed podaniem kolejnej porcji leku (decyduje lekarz kierujący)
- ✓ badanie kontrolne po leczeniu można przeprowadzić najwcześniej po 3 dniach od zakończenia stosowania antybiotyku.

1) SPOSÓB POBRANIA I TRANSPORTU PLWOCINY:

- ✓ pacjent rano przed odkrztuszeniem **powinien dokładnie umyć zęby (wyjąć protezę)**,
- ✓ wypłukać usta przegotowaną wodą,
- ✓ plwocinę odkrztusić bezpośrednio do jałowego pojemnika
- ✓ pojemnik dokładnie zamknąć
- ✓ materiał dostarczyć do badania w ciągu 3 godzin od pobrania

Pojemnik musi być zabezpieczony przed uszkodzeniem i dokładnie opisany zgodnie ze skierowaniem.

2) SPOSÓB PRZYGOTOWANIA DO POBRANIA WYMAZU Z GARDŁA:

- ✓ **pacjentowi rano przed wykonaniem wymazu z gardła nie wolno myć zębów, przeplukiwać jamy ustnej ani spożywać pokarmów.**

**Załącznik nr 10
do Podręcznika
Pobierania Próbek
Pierwotnych**

Wydanie 2.0

Instrukcja samodzielnego pobierania PLWOCINY dla pacjenta
do badania mikrobiologicznego i przygotowania do wymazu gardła



Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

32 396 46 37 • 32 396 46 60
zdl@szpital4.bytom.pl

Przygotowanie pacjenta do badania:

- ✓ badanie należy wykonać przed rozpoczęciem antybiotykoterapii,



- ✓ w razie konieczności przeprowadzenia badania w trakcie antybiotykoterapii, materiał należy pobrać przed podaniem kolejnej porcji leku (decyduje lekarz kierujący)
- ✓ badanie kontrolne po leczeniu można przeprowadzić najwcześniej po 3 dniach od zakończenia stosowania antybiotyku.

1) SPOSÓB POBRANIA I TRANSPORTU PLWOCINY:

- ✓ pacjent rano przed odkrztuszeniem **powinien dokładnie umyć zęby (wyjąć protezę)**,
- ✓ wypłukać usta przegotowaną wodą,
- ✓ plwocinę odkrztusić bezpośrednio do jałowego pojemnika
- ✓ pojemnik dokładnie zamknąć
- ✓ materiał dostarczyć do badania w ciągu 3 godzin od pobrania

Pojemnik musi być zabezpieczony przed uszkodzeniem i dokładnie opisany zgodnie ze skierowaniem.

2) SPOSÓB PRZYGOTOWANIA DO POBRANIA WYMAZU Z GARDŁA:

- ✓ **pacjentowi rano przed wykonaniem wymazu z gardła nie wolno myć zębów, przeplukiwać jamy ustnej ani spożywać pokarmów.**